

Рекомендованная вакцинация

- Nimerix (Менингококк серогруппы А,С,W,Y) (Азия)
- Bexsero (Менингококк серогруппы В) (Европа)
- Pneumovax (Пневмококк)

NIMENRIX - Порошок + Растворитель для смешивания раствора для инъекции в одноразовом готовом шприце

Состав:

1 дозировка 0,5 мл содержит:

Менингококк полисахарид Т конъюгат вакцина, тетравалент	STV	
(соответствует Neisseria Meningitidis тип А)	SYN	5 µg
(соответствует Neisseria Meningitidis тип С)	SYN	5 µg
(соответствует Neisseria Meningitidis тип W 135)	SYN	5 µg
(соответствует Neisseria Meningitidis тип Y)	SYN	5 µg
(соответствует Tetanus-Toxoid)	STV	44 µg
Порошок		
Сахароза	WST HST	
Трис	WST HST	
Растворитель		
Хлорид натрия	WST HST	
Вода для инъекций	STV HST	

Свойства и действие:

Вакцина

Показания к применению:

Активная иммунизация от инвазивных заболеваний вызванных Neisseria meningitidis серогрупп А, С, W-135 и Y.

Способ применения:

Внутримышечная инъекция

Дозирование:

От 12 месяцев: 1 доза (0,5 мл).

BEXSERO – инъекционная суспензия в готовом одноразовом шприце

Состав:

1 дозировка 0,5 мл содержит:

<u>Менингок-В-вакцина, рекомбинированная</u>	STV		
<u>(соответствует <i>Neisseria meningitidis</i>, B, NHBA-Fusionsprotein)</u>	SY N		50 µg
<u>(соответствует <i>Neisseria meningitidis</i>, B, NadA-Protein)</u>	SY N		50 µg
<u>(соответствует <i>Neisseria meningitidis</i>, B, fHbp-Fusionsprotein)</u>	SY N		50 µg
<u>(соответствует <i>Neisseria meningitidis</i>, B, OMV, ствол NZ98/254, als P)</u>	SY N		25 µg
<u>Нанесено на</u>			
<u>Гидроксид алюминия</u>	SY N	HST	
<u>(соответствует Al 3+)</u>	SY N	HST	0.5000 mg
<u>Хлорид натрия</u>	WS T	HST	
<u>Хистидин</u>	SY N	HST	
<u>Сахароза</u>	WS T	HST	
<u>Вода для инъекций</u>	STV	HST	

Свойства и действие:

Вакцина

Показания к применению:

Активная иммунизация от инвазивных заболеваний вызванных *Neisseria meningitidis* серогрупп В.

Способ применения:

Внутримышечная инъекция

Дозирование:

Младенцы (2-5 месяцев): 3 дозировки, период ожидания не менее одного месяца. Первая инъекция в возрасте 2 месяцев. Повторная вакцинация в 2 года. Дети от 6 месяцев: 2 дозировки, период ожидания не менее 2 месяцев (от 11 лет: период ожидания не менее 1 месяца).

При первой вакцинации в два года повторная вакцинация составляет 1 дозировку в период 12-23 месяца после базовой программы иммунизации.

PNEUMOVAX 23 - раствор для инъекции в одноразовом готовом шприце

Состав:

1 дозировка 0,5 мл содержит:

Pneumokokken-Polysaccharid вакцина, 23 valent	SYN	
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 1)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp 2)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 3)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 4)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 5)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 6B)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 7F)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp 8)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp 9N)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 9V)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp 10A)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp 11A)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp 12F)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 14)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp 15B)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp 17F)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 18C)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 19F)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 19A)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp	SYN	25 µg

20)		
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp 22F)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken Polysaccharid Serotyp 23F)	SYN	25 µg
(соответствует Pneumokokken-Polysaccharid Serotyp 33F)	SYN	25 µg
Фенол	WST	HST
Хлорид натрия	WST	HST
Вода для инъекций	STV	HST

Свойства и действие:

Вакцина для активной иммунизации от пневмококков. Иммунитет на протяжении примерно 5-ти лет.

Показания к применению:

Активная иммунизация от пневмококков-пневмонии для детей от 2 лет с повышенным риском инфекции пневмококков, а также для пожилых пациентов.

Способ применения:

Внутримышечная инъекция

Дозировка:

Первая вакцинация: 1 дозировка (0,5 мл). Возможная последующая вакцинация, по рекомендации врача.